



Extra bescherming tegen bewaarziekten

- ▶ Breedwerkend fungicide tegen bewaarziekten in appel en peer
- ▶ 0,9 L/ha haag = 1,35 L/ha standaardboomgaard
- ▶ Max. 2 toepassingen
- ▶ 3 dagen wachttijd
- ▶ Uitstekend residuprofiel
- ▶ SC - suspensie concentraat
- ▶ Verpakking: 5 L
- ▶ Regenvastheid: 1 à 2 uur



Zorgeloze bewaring

Pomax is een veelzijdig **fungicide** dat door zijn unieke samenstelling zorgt voor een langdurige, effectieve bestrijding van **bewaarziekten** in **appel en peer**. Naast de uitstekende werking tegen Botrytis en Neofabraea, heeft Pomax ook een goede nevenwerking op andere bewaarschimmels.

Pomax combineert de werkzame stoffen **fludioxonil** en **pyrimethanil** in een gebruiksvriendelijke, vloeibare formulering. Fludioxonil werkt **preventief** en voorkomt de kieming van schimmelsporen op het vruchtoppervlak. Pyrimethanil werkt **curatief** systemisch, stopt de mycelium-groei en doodt zo de schimmel.

Pomax mag 2 maal toegepast worden in de periode vanaf 6 weken voor de oogst. De wachttijd is kort (3 dagen) en het residuprofiel erg gunstig. Daarom is Pomax ideaal geschikt om uw fruit net voor de pluk de nodige bescherming mee te geven voor een zorgeloze bewaring.

Unieke combinatie van curatief & preventief

Pomax is het eerste fungicide dat de lange preventieve werking van fludioxonil koppelt aan de sterke curatieve werking van pyrimethanil, waardoor het een zeer effectief en breedwerkend middel is.

FLUDIOXONIL
133 g/l

Preventief
Contact

Inhibeert sporenkieming




PYRIMETHANIL
336 g/l

Curatief
Translaminair

Inhibeert myceliumgroei

Superieure werking tegen bewaarziekten

Uit onafhankelijke proeven blijkt dat Pomax gemiddeld de hoogste effectiviteit heeft tegen de belangrijkste bewaarschimmels in appel en peer.



Switch en Geoxe zijn geregistreerde merken van Syngenta. Bellis is een geregistreerd merk van BASF.

Uitstekend residuprofiel

Na 2 bespuitingen met Pomax ligt het teruggevonden residu van beide actieve stoffen bij de pluk ver beneden de Europese MRL en zelfs ruim onder de 33% MRL die sommige retailers hanteren.

Residu (mg/kg) na 2 behandelingen met Pomax, 10 en 3 dagen voor de pluk

